



Ticster® Plus Spot-on für Hunde

Ticster® Plus Spot-on für Hunde ist ein hochwirksames Mittel zur äußeren Anwendung bei Hunden. Es bietet einen zuverlässigen und lang anhaltenden Schutz vor Zecken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) und Flöhen (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*). Die einmalige Gabe einer Ticster® Plus Spot-on Tube schützt bis zu 4 Wochen vor dem Wiederbefall mit Zecken und Flöhen. Die Behandlung kann wiederholt werden, falls der zuvor behandelte Hund mehrfach in heftigen Regen oder ins Wasser geraten ist.

Dosierung und Anwendung




Hunde bis 10 kg

(3a) Zum Auftropfen auf die Haut im Nacken. (1) Das Fell auseinanderheben bis die Haut sichtbar wird. (2) Die Spitze der Tube leicht auf die Haut aufsetzen und den Inhalt der Tube vollständig auf die Haut auftropfen.

Hunde über 10 kg

(3b) Für Hunde über 10 kg Körpergewicht sollte der gesamte Inhalt einer Ticster® Plus Spot-on Tube gleichmäßig auf vier Punkte über der Rückenlinie des Hundes, vom Nacken bis zum Schwanzansatz, verteilt werden. (1) An jedem der vier Punkte das Fell soweit auseinanderheben, bis die Haut sichtbar wird. (2) Die Spitze der Tube leicht auf die Haut aufsetzen und leicht drücken, um einen Teil der Lösung direkt auf die Haut zu tropfen.

Um zu vermeiden, dass die Lösung an der Seite des Tieres herunterläuft, sollte die verabreichte Lösungsmenge pro Auftragsstelle nicht zu groß gewählt werden. Nur auf unversehrte Haut aufbringen.



Wirkstoffe

Hunde bis 4 kg

0,48 ml (=1 Tube)

Eine **0,48 ml Tube** enthält: Permethrin 200 mg, Imidacloprid 40 mg, Pyriproxyfen 2 mg, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 0,2 mg

Hunde bis 4–10 kg

1,2 ml (=1 Tube)

Eine **1,2 ml Tube** enthält: Permethrin 500 mg, Imidacloprid 100 mg, Pyriproxyfen 5 mg, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 0,5 mg

Hunde 10–25 kg

3,0 ml (=1 Tube)

Eine **3,0 ml Tube** enthält: Permethrin 1250 mg, Imidacloprid 250 mg, Pyriproxyfen 12,5 mg, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 1,25 mg

Hunde über 25 kg

4,8 ml (=1 Tube)

Eine **4,8 ml Tube** enthält: Permethrin 2000 mg, Imidacloprid 400 mg, Pyriproxyfen 20 mg, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 2 mg



Anwendungshinweise:

Nicht bei jungen Hunden unter 3 Monaten anwenden. Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Hunde mit Hautläsionen, insbesondere an den vorgesehenen Applikationsorten, sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden. An der Applikationsstelle kann vorübergehend Juckreiz auftreten. Gelegentlich sind Haarausfall oder Blasenbildung an der Applikationsstelle beobachtet worden.



Warnung: NICHT bei Katzen anwenden. Das Mittel ist äußerst giftig für Katzen und kann tödliche Folgen haben.

In Mehrtierhaushalten bitte darauf achten, dass die Tiere bis zum Abtrocknen des Produktes getrennt sind, damit sie sich nicht gegenseitig ablecken.

Achtung!

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behandelte Hunde sind für 2 Tage von Gewässern fernzuhalten und sollten in diesen nicht baden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Das Lösungsmittel in Ticster® Plus Spot-on kann bestimmte Materialien, wie Leder, Stoffe, Kunststoffe und polierte Oberflächen angreifen. Die Applikationsstelle sollte vor Kontakt mit solchen Materialien getrocknet sein. Bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Lösungsmittel kann es vereinzelt zu kurzzeitigen allergischen Reaktionen kommen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.



Enthält Permethrin (CAS-Nr. 52645-53-1), Benzylalkohol (CAS-Nr. 100-51-6), Imidacloprid (CAS-Nr. 138261-41-3).

Nicht über 25°C aufbewahren.
BAUA-Reg.-Nr.: N-86588
UFI: TCFR-JRAR-0H29-KA8Y

Mindestens haltbar bis Ende / Ch.-B.: siehe Aufdruck

ConVet GmbH & Co. KG
Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim
www.ticster.pet

Vertrieb:
O'ZOO GmbH Tierarzneimittel
Am Industriegelände 5
D-19288 Ludwigslust
Tel. +49 38722 1590-10
Fax +49 38722 1590-19
info@o-zoo.de
www.o-zoo.de

