

Löst den schleim und erleichtert das Abhusten



WENN ZÄHFLÜSSIGER SCHLEIM DAS ABHUSTEN ERSCHWERT

Bei Erkrankungen der Atemwege treten oft eine vermehrte Schleimproduktion in den Bronchien und der Lunge auf. Zäher Schleim kann Erkrankten das Abhusten schwer machen. Ambroxolhydrochlorid STADA® löst den Schleim und erleichtert das Abhusten. Der schleimlösende Sirup kann gerade bei Schmerzen in Hals und Rachen einfacher eingenommen werden als Tabletten.

AMBROXOLHYDROCHLORID STADA® – ZUR SCHLEIMLÖSUNG BEI ERKRANKUNGEN DER BRONCHIEN UND DER LUNGE

- Löst zähflüssigen Schleim
- Gut verträglich
- Auch für Kinder ab 2 Jahren geeignet
- Angenehm im Geschmack



SO WIRKT AMBROXOLHYDROCHLORID STADA®

Der schleimlösende Wirkstoff Ambroxol verflüssigt den Schleim und erleichtert so das Abhusten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Erwachsene nehmen für 2-3 Tage 3x täglich 5ml ein, danach 2x täglich 5ml.
Kinder von 6-12 Jahren nehmen 2-3x täglich 2,5ml ein.
Kinder von 2-6 Jahren nehmen 3x täglich 1,25ml ein.

Die Packung enthält einen Messlöffel zur Erleichterung der Einnahme des Sirups. Ambroxolhydrochlorid STADA® kann zu oder unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie lange sollte Ambroxolhydrochlorid STADA® eingenommen werden?

Ohne ärztlichen Rat sollte die Dauer der Anwendung 4 – 5 Tage nicht überschreiten.

Was macht man, wenn man zu viel Ambroxolhydrochlorid STADA® eingenommen hat?

Es sind keine Fälle einer Vergiftung mit Ambroxolhydrochlorid bekannt. Die bei versehentlicher Überdosierung und/oder Arzneimittelverwechslung beobachteten Symptome stimmen mit den bekannten Nebenwirkungen von Ambroxolhydrochlorid, die bei der empfohlenen Dosierung auftreten können, überein. Eine symptomatische Behandlung kann erforderlich sein.

Kann Ambroxolhydrochlorid STADA® in der Schwangerschaft und der Stillzeit eingenommen werden?

Es gibt keine Hinweise auf Nebenwirkungen während der Schwangerschaft. Dennoch sollte Ambroxolhydrochlorid STADA® während der ersten 3 Monate der Schwangerschaft nicht eingenommen werden. Ambroxolhydrochlorid geht in die Muttermilch über, deshalb wird die Einnahme von Ambroxolhydrochlorid STADA® während der Stillzeit nicht empfohlen.

Ambroxolhydrochlorid STADA® 30 mg/5 ml Sirup. Zur Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren. Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid. Ambroxolhydrochlorid STADA® wird angewendet zur schleimlösenden Behandlung bei Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren. Wenn Sie sich nach 4 – 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, müssen Sie sich an einen Arzt wenden. Enthält Sorbitol und Benzoessäure. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel. Stand: September 2020